



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
**RHÔNE-ALPES**

*Grandes Cultures*

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 4 - 13 Avril 1989

**Colza** : Toujours le Sclerotinia  
**Céréales** : Stratégie de lutte contre les maladies ; situation  
**Tournesol** : Désherbage  
**Maïs** : Dépliant ravageurs - mauvaises herbes ci-joint



### COLZA

#### Situation

Avec le rabaissement des températures actuelles, la floraison s'échelonne beaucoup, ce qui accroît les risques de contamination par le Sclerotinia.

#### Préconisation

Il est toujours temps d'intervenir contre le Sclerotinia (voir pour les produits et modalités, notre fiche "Maladies du colza" jointe à notre précédent Bulletin).

Rectificatif : sur cette fiche, la spécialité "CALIDAN" figurait dans les colonnes "Cylindrosporiose" et "Sclerotinia". Il convient d'ajouter que cette spécialité est également homologuée contre le Pseudocercospora et l'Alternaria.

60 10 615 27

### CEREALES : Stratégie de lutte contre les maladies (avec la collaboration de l'ITCF)

Basée toujours sur un certain nombre de critères (2 périodes principales d'intervention : montaison-épiaison, calées par l'observation sur le terrain, le tout sous la dépendance du niveau de risques, symbolisé par le niveau de rendement attendu) cette stratégie acquiert de plus en plus un caractère régional par l'expérience des observations répétées.

Ainsi donc, les septorioses et les rouilles déclenchent souvent des attaques tardives en dehors des périodes habituelles de traitement. Les maladies du pied se manifestent souvent de façon négligeable au stade 7 (2 noeuds).

Si ces données se concrétisent encore cette année, la tendance serait de déplacer les époques d'applications de la façon suivante :

- 1er traitement au stade 8-9 (début gonflement) en l'absence de symptômes importants au stade 7. L'expérience montre que ce traitement est cependant indispensable, même si ces symptômes restent faibles.

- 2ème traitement au stade 10-5-1/10-5-2 (début floraison), soit 10-3 (1/2 épiaison) + 7 à 15 jours, pour prévenir les attaques tardives de Septoriose ou de Rouille brune, si celles-ci n'ont pas été observées à 10-3. L'expérience montre là par contre qu'un 3ème traitement (effectué lorsque les 2 premiers l'ont été aux stades traditionnels 7 et 10-3), s'avère rarement rentable dans notre région.

Sur ces bases, l'ITCF a élaboré et diffusé lors du Forum "Optimum Grandes Cultures" du 08/06/88 à Satolas, un tableau à partir d'expérimentations menées depuis 10 ans, et qui tient en compte dans l'évaluation des risques des facteurs suivants : région agricole, variété, précédent, date de semis, quantité d'azote apportée. Chaque facteur est noté et le total donne la note de risque. Ce tableau est paru dans notre Bulletin n° 7 du 11 Mai 1988.

#### Situation

En moyenne les blés sont au stade 6 (1 noeud) et les orges au stade 7 (2 noeuds). Peu d'évolution des maladies par rapport à la semaine dernière, mais cela pourrait venir en cas de rehaussement des températures.

#### Préconisation

Il est toujours temps d'intervenir sur la Rhynchosporiose de l'orge et éventuellement sur l'Helminthosporiose si celle-ci s'étend. Attendre encore sur les blés dont la principale affection reste le Rhizoctone.

7202

## TOURNESOL : Désherbage

Cette culture est très sensible à la concurrence des mauvaises herbes en début de végétation, jusqu'au stade 5-6 paires de feuilles. Pendant une période de 30 à 40 jours, elle doit être protégée par un traitement herbicide.

Seule une intervention de pré-semis et/ou de post-semis prélevée permet de contrôler les dicotylédones. Après la levée de la culture, aucune possibilité de rattrapage n'est envisageable mis à part le binage. Le programme de désherbage doit donc être soigneusement choisi en fonction des dicotylédones qui risquent d'apparaître dans la parcelle. D'une manière générale, c'est un programme à base d'un herbicide de pré-semis suivi d'une spécialité de post-semis prélevée qui permet d'obtenir une efficacité régulière et d'un bon niveau sur un large éventail de dicotylédones.

Ce type de programme permet également de mieux s'affranchir des périodes de sécheresse survenant après le semis qui peuvent handicaper les herbicides de post-semis prélevée.

Par contre, les graminées peuvent être détruites en post-levée, en plus des possibilités offertes en pré-semis et en post-semis pré-levée.

### LES TROIS EPOQUES D'APPLICATION :

#### Pré-semis avec incorporation :

L'incorporation des produits doit être faite sur 6 à 8 cm de profondeur, dans les 24 heures pour la trifluraline (nombreuses spécialités) et dans les 7 jours pour le PROWL.

L'AVADEX et l'AVADEX BW à 3.5 l/ha sont à réserver aux terres infestées de folles avoines.

DUELOR doit être utilisé de préférence en pré-semis afin d'avoir une efficacité optimale.

La firme préconise l'emploi d'ORCAL dans le cadre d'une succession de spécialités : ORCAL 2.5 kg/ha (pré-semis) puis RACER ME 2 l/ha (post-semis pré-levée) ou ORCAL 2.5 kg/ha (pré-semis) puis CHALLENGE 600 3.5 l/ha (post-semis pré-levée).

#### Post-semis pré-levée :

En règle générale, l'application des herbicides doit être effectuée le plus tôt possible après le semis.

Le linuron doit être appliqué dans les 48 heures après le semis. Son efficacité est liée à de bonnes conditions de pluviométrie après traitement. Il est phytotoxique, notamment en sols légers, lorsqu'il migre par lessivage, après de fortes précipitations, jusqu'aux racines de la culture.

Le RONSTAR peut provoquer des brûlures sur cotylédons et premières paires de feuilles s'il est projeté mécaniquement par des gouttes d'eau de pluies violentes après une période de sécheresse. Le RONSTAR peut s'employer en pré-levée en association avec le LEGURAME ou dans le cadre d'une succession incluant, en pré-semis, la trifluraline à 1200 g de ma/ha ou DUELOR à 2.2 l/ha.

La nouvelle formulation du RACER (micro-encapsulée) présente une meilleure sélectivité ainsi qu'un risque amoindri pour les cultures voisines par rapport à l'ancienne formulation. Le rinçage du pulvérisateur est lui aussi facilité. Ce produit doit cependant être appliqué dans les conditions prescrites par la firme : pression maximum du pulvérisateur : 2.5 kg ; utilisation de buses à fente ; abaisser la rampe le plus possible ; traitement par temps calme, sans vent, pour éviter une éventuelle dérive ; nettoyage soigné du pulvérisateur après traitement et avant séchage du produit sur les parois.

Le CHALLENGE 600 s'est révélé très sélectif de la culture. Cette spécialité doit s'employer avant tout en pré-levée. Cependant, la firme précise qu'en cas de conditions difficiles au semis, il est possible d'utiliser CHALLENGE 600 jusqu'à la levée du tournesol (stade cotylédons). C'est un herbicide à utiliser de préférence dans le cadre d'un programme incluant une spécialité de pré-semis (TREFLAN, DUELOR, PROWL...) afin d'avoir un contrôle des dicotylédones qui soit le plus étendu possible.

#### Post-levée :

Les seuls produits utilisables à cette époque sont des anti-graminées spécifiques efficaces par voie foliaire.

PRODUITS	GRAMINEES ANNUELLES	GRAMINEES VIVACES
FERVIN	1.0 kg/ha + huile	1.5 kg/ha + huile
FERVINAL	1.5 L/ha + huile	3 L/ha + huile
FUSILADE X2	0.75 L/ha + AGRAL	1.5 L/ha + AGRAL
GALLANT	1.0 L/ha	2.0 L/ha
TARGA	1.25 L/ha + huile	3.0 L/ha + huile

Les conditions d'emploi de FERVIN et FERVINAL doivent être respectées pour avoir une efficacité maximale : application le soir, par lumière pas trop intense et par température douce.



# PROTECTION DU MAÏS

ÉDITION 1989

lutte contre  
les  
ravageurs

Ministère de l'Agriculture  
Service de la Protection des Végétaux  
175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, Tél. 45.84.13.13

Association Générale des Producteurs de Maïs  
122, boulevard Tourasse, 64000 Pau, Tél. 59.30.69.77

Avec la collaboration de l'ACTA et de l'INRA



## Désinfection du sol

Matière active	Dose P.C. par ha	Produit commercial	Taupins	Scorgerie	Oscinie	Tenue à la Biod. (1)	Observations
<b>EN PLEIN</b>							
Lindane (2)	1,5 kg m.a.	Nombreux					8-10 j. avant le semis
Chlorpyrifos-éthyl + Lindane (2)	5 l.	Krégan Lorsban L16					pré-semis incorporé
Lindane + Diazinon (2)	8 l.	Deucalion, Iulex		•			pré-semis incorporé
Parathion-éthyl	5000 g m.a.	Nombreux					
<b>EN LOCALISATION</b>							
Aldicarbe + Lindane	15 kg	Témik M					Autorisé sur nématodes
Bendiocarbe	10 kg	Garvox 3 G					
Benfuracarbe	12 kg	Oncol 5 G					
Carbofuran	12 kg	Curater-Delex Diafuran-Rampar					
Carbofuran + Isophenphos	12 kg	Carma		•	★		
Carbosulfan	7,5 kg	Marshal fort	★				
Chlorméphas	6 kg	Dotan					
Chlorpyrifos-éthyl	10 kg	Dursban 5 G					
Fonofos	7 kg	Dyfonate 5 G					
Furathiocarbe	12 kg	Deltanet					
Phoxime	12 kg	Volaton 5					
Terbuphos	8 kg	Counter plus					

(1) Tenue à la biodégradation : risque d'efficacité insuffisante des carbamates dans les monocultures en sol riche en matière organique du Sud-Ouest (Landes, Pyrénées-Atlantiques) et de Limagne, dans le cas d'utilisation répétée depuis de nombreuses années.

(2) Lindane : étude en cours sur son manque d'efficacité ponctuel dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

## Vers gris

• Pulvérisation : au crépuscule avec au moins 800 l. d'eau/ha

• Appâts : résultats irréguliers

Matière active	Pulvérisation		Appâts ou granulés	
	Produit commercial	Dose P.C./ha	Produit commercial	Dose P.C. son : 50 kg/ha
Acéphate	Orthene 50	1,8 kg	Orthene 50	4,8 g/kg de son
Alphaméthrine	Fastac	0,2 l.		
Chlorpyrifos			Dursban appât	50 kg/ha
Cyperméthrine	Nombreux	30 g m.a.	Nombreux	0,3 g m.a./kg de son
λ-Cyhalothrine	Karate	0,15 l.		
Cyfluthrine	Baythroid	0,3 l.		
Deltaméthrine	Decis CE	0,3 l.		
Endosulfan + Parathion			Drifène AP Ekadrine	8 ml/kg de son
Esfenvalérate	Sumi-alpha	0,4 l.		
Lindane			Appâts au son Appâts formulés	4 g m.a./kg de son 30 à 50 kg/ha
Permethrine	Ambush Perthrine	0,2 kg	Ambush-Perthrine	2 ml/kg de son
Phoxime			Volaton 5	75 kg/ha

Légende générale : ■ bon ■ moyen ■ insuffisant

★ à confirmer • manque d'information

## Pyrle

—4—

Formulation	Matière active	Produit commercial	Dose P.C./ha	Efficacité
<b>PRODUIT BIOLOGIQUE</b>				
	Trichogrammes	Pyratyp TR16	200 cap./ha	
<b>PRODUITS CHIMIQUES</b>				
Granulés	Chlorpyrifos éthyl	Dursban 1,5 G	25 kg	
	Cyperméthrine	Ripcord G, Sherpa 2 G	25 kg	
	Deltaméthrine	Decis MG2	25 kg	
	Fénitrothion	Dotix	25 kg	
	Parathion-éthyl	Kriss 2,5 G	25 kg	
	Permethrine	Granador, Perthrine MG	25 kg	
Liquides	Phoxime	Volaton 2,5	25 kg	
	Alphaméthrine	Fastac	0,6 l.	
	Biphentrine	Talstar	0,2 l.	
	λ-Cyhalothrine	Karate	0,4 l.	
	Cyfluthrine	Baythroid	0,8 l.	
	Cyperméthrine	Nombreux	75 g m.a.	
	Deltaméthrine	Decis CE (1)	0,8 l.	
	Fenvalérate	Sumicidin 10 (2)	1,5 l.	

■ Risque de pullulation de pucerons — (1) 0,8 l. en traitement précoce, 0,5 l. en traitement classique — (2) Bonne efficacité s'il est appliqué à l'époque optimale.

## Pucerons

Matière active	Produit commercial	T. précoce Métopolophium	T. tardif Rhopalosiphum
Alphaméthrine	Fastac		•
Biphentrine	Talstar	•	•
Bromophos	Nexion 25, Rhodianex		•
λ-Cyhalothrine	Karate	•	•
Cyfluthrine	Baythroid	•	•
Cyperméthrine	Nombreux	•	•
Deltaméthrine	Decis CE		•
Esfenvalérate	Sumi-alpha	•	•
Fenvalérate	Sumicidin 10		•
Fluvalinate	Mavrik	•	•
Phosalone	Zolone FLO, Azofène FLO	•	•
Pyrimicarbe	Pirimor G faible rémanence		
Endosulfan + Thiométon	Serk	•	•

La dose est fonction du stade du maïs. Ne pas utiliser de mouillants. Pour un choix adapté consultez l'AGPM ou le S.P.V.

## Sésamie

Matière active	Produit commercial	Dose P.C./ha	Efficacité	Observations
<b>1<sup>er</sup> VOL</b>				
Diflubenzuron	Dimilin	0,5 kg		2 applications nécessaires
Fenvalérate	Sumicidin 10	0,75 l.		
<b>2<sup>e</sup> VOL</b>				
Diflubenzuron	Dimilin	0,5 kg		1 seule application
Fenvalérate	Sumicidin 10	1,5 l.		
Permethrine	Perthrine MG	25kg		

# PROTECTION DU MAÏS

ÉDITION 1989

lutte contre  
les  
mauvaises  
herbes

Ministère de l'Agriculture  
Service de la Protection des Végétaux  
175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, Tél. 45.84.13.13

Association Générale des Producteurs de Maïs  
122, boulevard Tourasse, 64000 Pau, Tél. 59.30.69.77  
Avec la collaboration de l'ACTA et de l'INRA



## Désherbage avant la levée du maïs

La dose de produit à appliquer varie selon la teneur en matière organique du sol. Pour les produits appliqués en post-semis, l'efficacité du traitement ne sera bonne que si la pluviométrie est suffisante.

Matière active	Produit commercial	Dose P.C./ha	Epoque de traitement		Efficacité sur les graminées estivales			Efficacité sur dicot. sensibles à l'atrazine	Action secondaire sur dicotylédones résistantes aux triazines				Observations
			pré-semis	post-semis pré-levée	panics	sétaires	digitaires		amarante	morelle	chénopode	renouées	
Alachlore	Lasso 15 granulé (1)	17 à 30 kg 4 à 7 l.											(1) Ajouter de l'atrazine à sa dose habituelle pour détruire les dicotylédones (2) Inefficace si plus de 5 % de matière organique (3) Freine le développement sur productions de semences (4) Incorporer profondément le jour du traitement. Efficacité liée à la qualité de l'incorporation. (5) Risque de phytotoxicité particulièrement en sol caillouteux, filtrant et semis mal recouvert. (6) Données de la firme à confirmer.
Alachlore + Atrazine	Lasso GD liquide Lasso GD	6 à 10 l. 25 à 40 kg											
Atrazine	Nombreux	1000/1500 g m.a.											
Atrazine + Cyanazine	Bellater extra fluide (2)	3 à 7 l.											
Butraline + Atrazine	Amexine p.m. (2) (3) (5)	5 à 6 kg											
EPTC	Capsolane (1) (3) (4)	8 à 14 l.											
Vernolate	Surpass 4 s (1) (3) (4)	7 à 11 l. (6)							★		★		
Métolachlor	Duelor (1)	2 à 3 l.											
Métolachlor + Atrazine	Primextra autosuspensible Primextra 15 microsec	4,5 à 10 l. 15 à 33 kg											
Simazine + Atrazine	Nombreux (2)	3 à 7 l.											
Pendiméthalin + Atrazine	Tazastomp C (2) (3) (5)	4 à 5 kg											

## Désherbage après la levée

• Graminées (1 à 2 f. max.) + dicotylédones résistantes

Matière active	Produit commercial	Sélectivité	Dose P.C./ha	Efficacité sur graminées estivales			Efficacité sur dicot. sensibles à l'atrazine	Action secondaire sur dicot. résistantes aux triazines			
				panics	sétaires	digitaires		amarante	morelle	chénopode	renouée
Alachlore + Atrazine + Pyridate	Tristar		8 à 10 kg								

Complément nécessaire à un traitement de pré-levée

• Dicotylédones résistantes aux triazines

Matière active	Produit commercial	Sélect.	Dose P.C./ha	Stade du maïs à ne pas dépasser	Efficacité sur adventices résistantes et stade optimum des adventices			
					Morelle	Chénopode	Amarante	Renouée
Bentazone + huile	Basagran + huile (1)		3 l. + huile	aucun	1 à 5 f.	1 à 5 f.	1 à 5 f.	1 à 4 f.
Bentazone + Atrazine	Laddok		4 l.	aucun	1 à 5 f.	1 à 5 f.	1 à 5 f.	1 à 5 f.
Bromoxynil phénol	Nombreux (2)		2,4 l.	6 f.	1 à 8 f.	1 à 8 f.	1 à 5 f.	1 à 5 f.
Dinoterbe	Herbogil (3)		3 l.	4 f.	1 à 5 f.	1 à 5 f.		1 à 3 f.
Pyridate	Lentagran PM Lentagran EC (4)		2 kg 2 l.	aucun	1 à 12 f. 1 à 12 f.	1 à 8 f. 1 à 8 f.	1 à 10 f. 1 à 10 f.	
Pyridate + Clopyralid	Pyron		1,5 l.	aucun	1 à 12 f.	1 à 8 f.	1 à 10 f.	
Bromoxynil phénol + Dicamba	Taquilan		2 l.	6 f.	1 à 6 f.	1 à 6 f.	1 à 6 f.	• 1 à 6 f.
Pyridate + Thiameturon-méthyle	Binex M	●	1,5 kg	8 f.	1 à 6 f.	• 1 à 5 f.	• 1 à 6 f.	• 1 à 4 f.

(1) Dose d'huile voir préconisation fabricant - (2) Utilisable jusqu'à 8 feuilles du maïs sur variétés tardives et par temps "poussant" - (3) Utilisable à 6 l/ha associé à la dose habituelle d'atrazine en post-semis, prélevée du maïs dans les régions à printemps pluvieux sur chénopode et morelle - (4) Avec la formulation liquide des cas de brûlures et de tassement de végétation dont les conséquences demandent à être connues expérimentalement, ont été observés en 1988

• Plantes vivaces

Matière active	Produit commercial	sélectivité	Dose P.C./ha et stade d'application	Adventices	Observations
Atrazine + huile	Nombreux		4 l. + 5 l. levée à 5 f. du maïs	Chiendant rampant	(1) Traitement en dirigé uniquement
Clopyralid + huile	Lontrel SF 100 ou Lontryx 200 + huile		(1,5 l. ou 0,7 l.) + 3 l. post levée des adventices	Chardon, laiteron, renouées	(2) Traitement en dirigé à 0,6 l. à partir de 50 cm de hauteur du maïs
2,4-D	Nombreux		0,7 l. à 1 l. m.a. (1)	Liseron, chardon, rumex	(3) Traitement en dirigé (0,5 l. à 1,25 l.) à partir de 50 cm de hauteur du maïs
Dicamba	Banvel 4 S (2)		0,6 l. levée à 6 f. du maïs si tm > 10°C et tMax. < 25°C	Liseron, chardon, rumex	
Fluroxypir	Starane 200 (3)		1 l. levée à 6 f. du maïs si tm > 10°C et tMax. < 25°C	Liseron, rumex, ronces	

Légende générale : ■ bon ■ moyen ■ insuffisant ■ traitement possible ● manque d'information ★ à confirmer ■ ou ■ ou ■ irrégulier

• Graminées estivales mal contrôlées en pré-levée

Levée à 5 feuilles du maïs	Traitement en plein
	- Atrazine + huile (4 l. + 5 l.) Peu efficace sur digitaires - Atrazine + Lentagran P.M. (2 l. + 2 kg) sur graminées au stade 2 feuilles - Atrazine + Pyron (2 l. + 1,5 l.)
40 à 50 cm du maïs	Traitement en dirigé
	- Amétryne + huile (2,5 l. + 5 l.) - Terbutryne + huile (4 l. + 5 l.) - Paraquat (3 l.) (a)

(a) Seul recours en cas de graminées résistantes aux triazines.